







Ich bin Einstein







Myslím to upřímně





Einsteinův zázračný rok 1905

“K elektrodynamice pohybujících se těles”



ANNALEN
DER
PHYSIK.

BEGRÜNDET UND FORTGEFÜHRT DURCH
F. A. C. GREN, L. W. GILBERT, J. C. POGGENDORFF, G. UND E. WIEDEMANN.

VIERTE FOLGE.

BAND 17.
DER GANZEN REIHE 322. BAND.

KURATORIUM:
F. KOHLRAUSCH, M. PLANCK, G. QUINCKE,
W. C. RÖNTGEN, E. WARBURG.

UNTER MITWIRKUNG
DER DEUTSCHEN PHYSIKALISCHEN GESELLSCHAFT
UND INSBESONDERE VON
M. PLANCK
HERAUSGEGEBEN VON
PAUL DRUDE.

MIT FÜNF FIGURENTAFELN.

LEIPZIG, 1905.
VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH.

891

3. *Zur Elektrodynamik bewegter Körper;*
von A. Einstein.

Daß die Elektrodynamik Maxwells — wie dieselbe gegenwärtig aufgefaßt zu werden pflegt — in ihrer Anwendung auf bewegte Körper zu Asymmetrien führt, welche den Phänomenen nicht anzuhaften scheinen, ist bekannt. Man denke z. B. an die elektrodynamische Wechselwirkung zwischen einem Magneten und einem Leiter. Das beobachtbare Phänomen hängt hier nur ab von der Relativbewegung von Leiter und Magnet, während nach der üblichen Auffassung die beiden Fälle, daß der eine oder der andere dieser Körper der bewegte sei, streng voneinander zu trennen sind. Bewegt sich nämlich der Magnet und ruht der Leiter, so entsteht in der Umgebung des Magneten ein elektrisches Feld von gewissem Energiewerte, welches an den Orten, wo sich Teile des Leiters befinden, einen Strom erzeugt. Ruht aber der Magnet und bewegt sich der Leiter, so entsteht in der Umgebung des Magneten kein elektrisches Feld, dagegen im Leiter eine elektromotorische Kraft, welcher an sich keine Energie entspricht, die aber — Gleichheit der Relativbewegung bei den beiden ins Auge gefaßten Fällen vorausgesetzt — zu elektrischen Strömen von derselben Größe und demselben Verlaufe Veranlassung gibt, wie im ersten Falle die elektrischen Kräfte.

Beispiele ähnlicher Art, sowie die mißlungenen Versuche, eine Bewegung der Erde relativ zum „Lichtmedium“ zu konstatieren, führen zu der Vermutung, daß dem Begriffe der absoluten Ruhe nicht nur in der Mechanik, sondern auch in der Elektrodynamik keine Eigenschaften der Erscheinungen entsprechen, sondern daß vielmehr für alle Koordinatensysteme, für welche die mechanischen Gleichungen gelten, auch die gleichen elektrodynamischen und optischen Gesetze gelten, wie dies für die Größen erster Ordnung bereits erwiesen ist. Wir wollen diese Vermutung (deren Inhalt im folgenden „Prinzip der Relativität“ genannt werden wird) zur Voraussetzung erheben und außerdem die mit ihm nur scheinbar unverträgliche





Einsteinův zázračný rok 1905 + 10

"Základy obecné theorie relativity"



ANNALEN
DER
PHYSIK.

BEGRÜNDET UND FORTGEFÜHRT DURCH
F. A. C. GREN, L. W. GILBERT, J. C. POGGENDORFF, G. u. E. WIEDEMANN, P. DRUDE.

VIERTE FOLGE.

BAND 49.

DER GANZEN REIHE 354. BAND.

KURATORIUM:
M. PLANCK, G. QUINCKE,
W. C. RÖNTGEN, W. VOIGT, E. WARBURG.

UNTER MITWIRKUNG
DER DEUTSCHEN PHYSIKALISCHEN GESELLSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON
W. WIEN UND M. PLANCK.

MIT EINEM PORTRÄT UND ZEHN FIGURENTAFELN.

LEIPZIG, 1916.
VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH.

1916. № 7.

ANNALEN DER PHYSIK.
VIERTE FOLGE. BAND 49.

1. *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie;*
von A. Einstein.

Die im nachfolgenden dargelegte Theorie bildet die denkbar weitgehendste Verallgemeinerung der heute allgemein als „Relativitätstheorie" bezeichneten Theorie; die letztere nenne ich im folgenden zur Unterscheidung von der ersteren „spezielle Relativitätstheorie" und setze sie als bekannt voraus. Die Verallgemeinerung der Relativitätstheorie wurde sehr erleichtert durch die Gestalt, welche der speziellen Relativitätstheorie durch Minkowski gegeben wurde, welcher Mathematiker zuerst die formale Gleichwertigkeit der räumlichen Koordinaten und der Zeitkoordinate klar erkannte und für den Aufbau der Theorie nutzbar machte. Die für die allgemeine Relativitätstheorie nötigen mathematischen Hilfsmittel lagen fertig bereit in dem „absoluten Differentialkalkül", welcher auf den Forschungen von Gauss, Riemann und Christoffel über nichteuklidische Mannigfaltigkeiten ruht und von Ricci und Levi-Civita in ein System gebracht und bereits auf Probleme der theoretischen Physik angewendet wurde. Ich habe im Abschnitt B der vorliegenden Abhandlung alle für uns nötigen, bei dem Physiker nicht als bekannt vorauszusetzenden mathematischen Hilfsmittel in möglichst einfacher und durchsichtiger Weise entwickelt, so daß ein Studium mathematischer Literatur für das Verständnis der vorliegenden Abhandlung nicht erforderlich ist. Endlich sei an dieser Stelle dankbar meines Freundes, des Mathematikers Grossmann, gedacht, der mir durch seine Hilfe nicht nur das Studium der einschlägigen mathematischen Literatur ersparte, sondern mich auch beim Suchen nach den Feldgleichu[ngen] der Gravitation unterstützte.

olge. 49. 50





“Praha je nádherná, tak krásná, že už sama stojí za velký výlet.”





“Praha je nádherná, tak krásná, že už sama stojí za velký výlet.”



“Domy a věci jsou poněkud špinavé a sešlé, . . . ”

“Vzduch je plný sazí, voda životu nebezpečná, . . . ”

“Na ulicích ostentativní přepych vedle plazící se bídy.”

“. . . lidé jsou mi tak cizí. To nejsou lidé s přirozeným smýšlením; bezcitnost a zvláštní směs třídně založené blahosklonnosti a servility, bez jakékoli dobré vůle ke spoluobčanům. . . . Nuznost myšlení bez víry.”

“. . . lidé povrchní, mělcí a neotesaní, ačkoli, zdá se, v zásadě dobromyslní.”

“Jsou mistrní kuchaři. Mnoho z nich má jistý půvab.”

“Moje místo a můj ústav mi dávají mnoho radosti.” “Mám tady krásný ústav a bohatou knihovnu. . . ” “. . . možnost hovět si ve vědeckém dumání nerušen.”

“Kolega Lampa říká, že zájem o vědu je zde u studentů velmi slabý. Ale věřím, že na tomto poli také platí ’jak zaseješ, tak sklidíš’. Nevzdávám své iluze tak snadno.”

V salonu paní Fantové

“. . . se scházela parta nerealistických lidí, odvolávajících se na středověk.”

“. . . že polobarbarskou Prahu opustím s lehkým srdcem, to je jisté.”



Jak to těm rovnicím sekne!

- $\left[(\gamma - 2\delta)^2 + \delta^2 k \sin^2\phi\right] xy + \delta^2 \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 1\right) = 7x\delta^4 \cos^2\phi - \frac{24kx\delta^2}{3+2k^3}$,
  $(r - M)\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} - \gamma x \delta^2 = \delta(r^2 - 2Mr + \delta^2) - x\gamma r(r - 2M)$,

  kde $x = x(t)$, $r = r(t)$; $\phi \neq \phi(t)$; γ, δ, k, M jsou konstanty



Jak to těm rovnicím sekne!

- $\left[(\gamma - 2\delta)^2 + \delta^2 k \sin^2\phi\right] xy + \delta^2 \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 1\right) = 7x\delta^4 \cos^2\phi - \frac{24kx\delta^2}{3+2k^3}$,
  $(r - M)\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} - \gamma x \delta^2 = \delta(r^2 - 2Mr + \delta^2) - x\gamma r(r - 2M),$

  kde $\quad x = x(t),\ r = r(t);\ \phi \neq \phi(t); \qquad \gamma,\ \delta,\ k,\ M$ jsou konstanty

- $\alpha \equiv 7\delta^2\cos^2\phi - \frac{24k}{3+2k^3}$
  $\beta \equiv \left(\frac{\gamma}{\delta} - 2\right)^2 + k\sin^2\phi$
  $y \equiv \sqrt{r^2 - 2Mr + \delta^2}\ \sin\phi$



Jak to těm rovnicím sekne!

- $\left[(\gamma-2\delta)^2+\delta^2 k\sin^2\phi\right] xy+\delta^2\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+1\right)=7x\delta^4\cos^2\phi-\frac{24kx\delta^2}{3+2k^3}$,
  $(r-M)\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}-\gamma x\delta^2=\delta(r^2-2Mr+\delta^2)-x\gamma r(r-2M)$,

  kde $x=x(t)$, $r=r(t)$; $\phi\neq\phi(t)$; γ, δ, k, M jsou konstanty

- $\alpha\equiv 7\delta^2\cos^2\phi-\frac{24k}{3+2k^3}$
  $\beta\equiv\left(\frac{\gamma}{\delta}-2\right)^2+k\sin^2\phi$
  $y\equiv\sqrt{r^2-2Mr+\delta^2}\ \sin\phi$

  $$\Longrightarrow\quad \begin{aligned}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}&=(\alpha-\beta y)x-1\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}&=(\delta-\gamma x)\,y\end{aligned}$$



Jak to těm rovnicím sekne!

- $$\left[(\gamma - 2\delta)^2 + \delta^2 k \sin^2\phi\right] xy + \delta^2 \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 1\right) = 7x\delta^4 \cos^2\phi - \frac{24kx\delta^2}{3+2k^3}\,,$$
  $$(r - M)\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} - \gamma x \delta^2 = \delta(r^2 - 2Mr + \delta^2) - x\gamma r(r - 2M),$$

  kde $\quad x = x(t)$, $r = r(t)$; $\phi \neq \phi(t)$; $\qquad \gamma$, δ, k, M jsou konstanty

- $$\alpha \equiv 7\delta^2 \cos^2\phi - \frac{24k}{3+2k^3}$$
  $$\beta \equiv \left(\frac{\gamma}{\delta} - 2\right)^2 + k\sin^2\phi$$
  $$y \equiv \sqrt{r^2 - 2Mr + \delta^2}\,\sin\phi$$
  $$\Longrightarrow \quad \begin{aligned} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= (\alpha - \beta y)x - 1 \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= (\delta - \gamma x)\, y - \;? \end{aligned}$$



Jak to těm rovnicím sekne!

- $\left[(\gamma - 2\delta)^2 + \delta^2 k \sin^2\phi\right] xy + \delta^2 \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 1\right) = 7x\delta^4 \cos^2\phi - \frac{24kx\delta^2}{3+2k^3}$,
  $(r - M)\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} - \gamma x \delta^2 = \delta(r^2 - 2Mr + \delta^2) - x\gamma r(r - 2M)$,

  kde $\quad x = x(t)$, $r = r(t)$; $\phi \neq \phi(t)$; $\qquad \gamma$, δ, k, M jsou konstanty

- $\alpha \equiv 7\delta^2 \cos^2\phi - \frac{24k}{3+2k^3}$
  $\beta \equiv \left(\frac{\gamma}{\delta} - 2\right)^2 + k\sin^2\phi$
  $y \equiv \sqrt{r^2 - 2Mr + \delta^2}\,\sin\phi$

$$\Longrightarrow \qquad \begin{aligned} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= (\alpha - \beta y)x - 1 \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= (\delta - \gamma x)\,y - ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= (\alpha - \beta y)x - 1 \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= (\delta - \gamma x)\,y - 1 \end{aligned}$$



Jak to těm rovnicím sekne!

- $\left[(\gamma - 2\delta)^2 + \delta^2 k \sin^2\phi\right] xy + \delta^2\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 1\right) = 7x\delta^4\cos^2\phi - \frac{24kx\delta^2}{3+2k^3}\,,$
  $(r - M)\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} - \gamma x\delta^2 = \delta(r^2 - 2Mr + \delta^2) - x\gamma r(r - 2M),$

  kde $\quad x = x(t)$, $r = r(t)$; $\phi \neq \phi(t)$; $\qquad \gamma$, δ, k, M jsou konstanty

- $\alpha \equiv 7\delta^2\cos^2\phi - \frac{24k}{3+2k^3}$
  $\beta \equiv \left(\frac{\gamma}{\delta} - 2\right)^2 + k\sin^2\phi$
  $y \equiv \sqrt{r^2 - 2Mr + \delta^2}\,\sin\phi$

$$\Longrightarrow \quad \begin{aligned} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= (\alpha - \beta y)x - 1 \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= (\delta - \gamma x)\,y - \,? \end{aligned}$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = (\alpha - \beta y)x - \text{konst?}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = (\delta - \gamma x)\,y - \text{konst?}$$



Jak to těm rovnicím sekne!

- $$\left[(\gamma-2\delta)^2+\delta^2 k\sin^2\phi\right]xy+\delta^2\left(\tfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+1\right)=7x\delta^4\cos^2\phi-\tfrac{24kx\delta^2}{3+2k^3}\,,$$
  $$(r-M)\tfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}-\gamma x\delta^2=\delta(r^2-2Mr+\delta^2)-x\gamma r(r-2M),$$

  kde $\quad x=x(t)$, $r=r(t)$; $\phi\neq\phi(t)$; $\qquad\gamma$, δ, k, M jsou konstanty

- $$\alpha\equiv 7\delta^2\cos^2\phi-\tfrac{24k}{3+2k^3}$$
  $$\beta\equiv\left(\tfrac{\gamma}{\delta}-2\right)^2+k\sin^2\phi$$
  $$y\equiv\sqrt{r^2-2Mr+\delta^2}\,\sin\phi$$
  $$\Longrightarrow\qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=(\alpha-\beta y)x-1, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=(\delta-\gamma x)\,y\;-\;?$$

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}&=(\alpha-\beta y)x-f(\check{r})\\[1em] \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}&=(\delta-\gamma x)\,y-g(\check{s})\end{aligned}}$$



Jak to těm rovnicím sekne!

- teoretický fyzik si rovnic hledí mnohem víc, než svého stolu



Jak to těm rovnicím sekne!

- teoretický fyzik si rovnic hledí mnohem víc, než svého stolu
- nemá rád dlouhé a košaté vzorce, nejen proto, že jsou nepříjemné



Jak to těm rovnicím sekne!

- teoretický fyzik si rovnic hledí mnohem víc, než svého stolu
- nemá rád dlouhé a košaté vzorce, nejen proto, že jsou nepříjemné
- nesepisuje jen do úhledných rovnic to, co se na přírodě naměří; občas si “tipne” jistou “harmonii” — symetrii, skrytou jednoduchost základních pravidel (často ve světě kolem vůbec ne zřejmou) $\longrightarrow$ pokusí se z toho odvodit teorii a pomocí té vysvětlit jistou třídu jevů, popř. předpovědět i jevy dosud neznámé



Jak to těm rovnicím sekne!

- teoretický fyzik si rovnic hledí mnohem víc, než svého stolu
- nemá rád dlouhé a košaté vzorce, nejen proto, že jsou nepříjemné
- nesepisuje jen do úhledných rovnic to, co se na přírodě naměří; občas si “tipne” jistou “harmonii” — symetrii, skrytou jednoduchost základních pravidel (často ve světě kolem vůbec ne zřejmou) $\longrightarrow$ pokusí se z toho odvodit teorii a pomocí té vysvětlit jistou třídu jevů, popř. předpovědět i jevy dosud neznámé

  ONO TO FUNGUJE!



Jak to těm rovnicím sekne!

- teoretický fyzik si rovnic hledí mnohem víc, než svého stolu
- nemá rád dlouhé a košaté vzorce, nejen proto, že jsou nepříjemné
- nesepisuje jen do úhledných rovnic to, co se na přírodě naměří; občas si “tipne” jistou “harmonii” — symetrii, skrytou jednoduchost základních pravidel (často ve světě kolem vůbec ne zřejmou) $\longrightarrow$ pokusí se z toho odvodit teorii a pomocí té vysvětlit jistou třídu jevů, popř. předpovědět i jevy dosud neznámé

  ONO TO často FUNGUJE (na mnoha úrovních)



Jak to těm rovnicím sekne!

- teoretický fyzik si rovnic hledí mnohem víc, než svého stolu
- nemá rád dlouhé a košaté vzorce, nejen proto, že jsou nepříjemné
- nesepisuje jen do úhledných rovnic to, co se na přírodě naměří; občas si "tipne" jistou "harmonii" — symetrii, skrytou jednoduchost základních pravidel (často ve světě kolem vůbec ne zřejmou)
  $\longrightarrow$ pokusí se z toho odvodit teorii a pomocí té vysvětlit jistou třídu jevů, popř. předpovědět i jevy dosud neznámé

  ONO TO často FUNGUJE (na mnoha úrovních)
- R. Feynman: "Pravdu poznáte podle její krásy a jednoduchosti."



Jak to těm rovnicím sekne!

- teoretický fyzik si rovnic hledí mnohem víc, než svého stolu
- nemá rád dlouhé a košaté vzorce, nejen proto, že jsou nepříjemné
- nesepisuje jen do úhledných rovnic to, co se na přírodě naměří; občas si “tipne” jistou “harmonii” — symetrii, skrytou jednoduchost základních pravidel (často ve světě kolem vůbec ne zřejmou) $\longrightarrow$ pokusí se z toho odvodit teorii a pomocí té vysvětlit jistou třídu jevů, popř. předpovědět i jevy dosud neznámé

  ONO TO často FUNGUJE (na mnoha úrovních)
- J. Kepler: “Hle, sám Bůh, který byl příliš dobrý, než aby se neprojevil, vložil svou hru do symbolů a poslal tak známky své podoby na svět. Proto se odvažuji myslet si, že celá příroda a blahoslavené nebe jsou psány v jazyce geometrie a jazyce jednoduchém.”



Jak to těm rovnicím sekne!

- teoretický fyzik si rovnic hledí mnohem víc, než svého stolu
- nemá rád dlouhé a košaté vzorce, nejen proto, že jsou nepříjemné
- nesepisuje jen do úhledných rovnic to, co se na přírodě naměří; občas si “tipne” jistou “harmonii” — symetrii, skrytou jednoduchost základních pravidel (často ve světě kolem vůbec ne zřejmou) $\longrightarrow$ pokusí se z toho odvodit teorii a pomocí té vysvětlit jistou třídu jevů, popř. předpovědět i jevy dosud neznámé

  ONO TO často FUNGUJE (na mnoha úrovních)
- Pythagoras, Platón, Kepler, Leibniz, Hilbert, Einstein, Weyl, Born, Dirac, Feynman, Wigner, Chandrasekhar, Witten, . . .



Jak to těm rovnicím sekne!

- teoretický fyzik si rovnic hledí mnohem víc, než svého stolu
- <u>nemá</u> rád dlouhé a košaté vzorce, nejen proto, že jsou nepříjemné
- nesepisuje jen do úhledných rovnic to, co se na přírodě naměří; občas si "tipne" jistou "harmonii" — symetrii, skrytou jednoduchost základních pravidel (často ve světě kolem vůbec ne zřejmou) $\longrightarrow$ pokusí se z toho odvodit teorii a pomocí té vysvětlit jistou třídu jevů, popř. předpovědět i jevy dosud neznámé

  ONO TO často FUNGUJE (na mnoha úrovních)
- Pythagoras, Platón, Kepler, Leibniz, Hilbert, Einstein, Weyl, Born, Dirac, Feynman, Wigner, Chandrasekhar, Witten, . . .
- Hans Reichenbach: "Co vás přivedlo k obecné relativitě?"
  Albert Einstein: "Byl jsem pevně přesvědčen o harmonii vesmíru."



Jak to těm rovnicím sekne!

- teoretický fyzik si rovnic hledí mnohem víc, než svého stolu
- nemá rád dlouhé a košaté vzorce, nejen proto, že jsou nepříjemné
- nesepisuje jen do úhledných rovnic to, co se na přírodě naměří; občas si "tipne" jistou "harmonii" — symetrii, skrytou jednoduchost základních pravidel (často ve světě kolem vůbec ne zřejmou) $\longrightarrow$ pokusí se z toho odvodit teorii a pomocí té vysvětlit jistou třídu jevů, popř. předpovědět i jevy dosud neznámé

  ONO TO často FUNGUJE (na mnoha úrovních)
- Pythagoras, Platón, Kepler, Leibniz, Hilbert, Einstein, Weyl, Born, Dirac, Feynman, Wigner, Chandrasekhar, Witten, . . .
- Hans Reichenbach: "Co vás přivedlo k obecné relativitě?"
  Albert Einstein: "Byl jsem pevně přesvědčen o harmonii vesmíru."
- Steven Weinberg: "Věřím, že to byl vnitřní půvab, který udržoval víru fyziků v obecnou relativitu po desetiletí. . . "



Theorie relativity speciální i obecné



předmluva autora k čs. vydání (1923)

Těší mne, že tato malá knížka, v níž jsou bez matematického propracování vyloženy hlavní myšlenky theorie relativity, vychází nyní v národní řeči oné země, v níž nalezl jsem soustředění nutné k tomu, abych základní ideu obecné theorie relativity, kterou jsem pojal již r. 1908, ponenáhlu přiodíval určitější formou. V tichých místnostech ústavu pro theoretickou fyziku pražské německé univerzity ve Viničné ulici jsem objevil, že z ekvivalenčního principu vyplývá odchylka světelných paprsků v blízkosti Slunce v míře pozorovatelné, aniž jsem tehdy věděl, že před více než sto lety podobný důsledek byl odvozen z Newtonovy mechaniky a z jeho emissní theorie světla. V Praze jsem také objevil důsledek o posunu spektrálních čar k červenému konci, který doposud není bezvadně potvrzen. . . .







(1)

Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie.

~~A. Prinzipielle Erwägungen zum Postulat der Relativität.~~

§1. ~~Die spezielle Relativitätstheorie.~~

Die im Nachfolgenden dargelegte Theorie bildet die denkbar weitgehendste Verallgemeinerung der heute allgemein als „Relativitätstheorie" bezeichneten Theorie; die letztere nenne ich im Folgenden „spezielle Relativitätstheorie" zur Unterscheidung von der ersteren und setze sie als bekannt voraus. Die Verallgemeinerung der Relativitätstheorie wurde sehr erleichtert durch die Gestalt, welche der speziellen Relativitätstheorie durch Minkowski gegeben wurde, welcher Mathematiker zuerst die formale Gleichwertigkeit der räumlichen Koordinaten und der Zeitkoordinate klar erkannte und für den Aufbau der Theorie nutzbar machte. Die für die allgemeine Relativitätstheorie nötigen mathematischen Hilfsmittel lagen fertig bereit in dem „absoluten Differentialkalkül", welcher auf den Forschungen von Gauss, Riemann und Christoffel über nichteuklidische Mannigfaltigkeiten ruht und von Ricci und Levi-Civita in ein System gebracht und bereits auf Probleme der theoretischen Physik angewendet wurde. Ich habe im Abschnitt B der vorliegenden Abhandlung alle für uns nötigen, bei dem Physiker nicht als bekannt vorauszusetzenden mathematischen Hilfsmittel in möglichst einfacher und durchsichtiger Weise entwickelt, sodass ein Studium mathematischer Literatur für das Verständnis der vorliegenden Abhandlung nicht erforderlich ist. Endlich sei an dieser Stelle dankbar meines Freundes, des Mathematikers Grossmann gedacht, der mir durch seine Hilfe nicht nur das Studium der einschlägigen mathematischen Literatur ersparte, sondern mich auch beim Suchen nach den Feldgleichungen der Gravitation unterstützte.

A. Prinzipielle Erwägungen zum Postulat der Relativität.

§1. Bemerkungen zu der speziellen Relativitätstheorie.

Der speziellen Relativitätstheorie liegt folgendes Postulat zugrunde, welchem auch durch die Galilei-Newton'sche Mechanik Genüge geleistet wird: Wird ein Koordinatensystem K so gewählt, dass in Bezug auf dasselbe die physikalischen Gesetze in ihrer einfachsten Form gelten, so gelten dieselben Gesetze auch in Bezug auf jedes andere Koordinatensystem K', das relativ zu K in gleichförmiger Translationsbewegung begriffen ist. Dies Postulat nennen wir „spezielles Relativitätsprinzip." Durch das Wort „speziell" soll angedeutet werden, dass das Prinzip auf den

Obecná teorie relativity

(jak Albert Einstein ošatil das Relativitätsprinzip)



Elegantní již v négligée

- Princip obecné relativity (Princip obecné kovariance)



Elegantní již v négligée

- Princip obecné relativity (Princip obecné kovariance)
- Princip ekvivalence



K PRINCIPU RELATIVITY A ZÁVĚRŮM Z NĚJ VYVOZENÝM

Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik 4 (1907) 411-462

V. Princip relativity a gravitace

&17. Urychlený vztažný systém a gravitační pole

Princip relativity, t.j. předpoklad, že fyzikální zákony jsou nezávislé na pohybovém stavu vztažné soustavy, jsme zatím použili jen na soustavy neurychlené. Je myslitelné, aby princip relativity platil také pro soustavy, které jsou vůči sobě urychlené? ...

Uvažujme dvě pohybující se soustavy Σ_1 a Σ_2. Nechť Σ_1 je urychlená ve směru své osy x a nechť g je (v čase konstantní) velikost tohoto zrychlení. Σ_2 bude v klidu, ale bude umístěna v homogenním gravitačním poli, které udílí všem objektům zrychlení $-g$ ve směru osy x.

Pokud víme, fyzikální zákony vzhledem k Σ_1 se neliší od zákonů vzhledem k Σ_2; je to založeno na faktu, že všechna tělesa jsou v gravitačním poli urychlena stejně. Za současného stavu našich zkušeností nemáme tedy žádný důvod se domnívat, že systémy Σ_1 a Σ_2 se v jakémkoli ohledu liší, a v následující diskusi proto předpokládáme úplnou fyzikální ekvivalenci gravitačního pole a odpovídajícího zrychlení vztažné soustavy.

Tento předpoklad rozšiřuje princip relativity na rovnoměrně zrychlený translační pohyb referenčního systému. Heuristická hodnota tohoto předpokladu spočívá v tom, že dovoluje náhradu homogenního gravitačního pole rovnoměrně zrychleným vztažným systémem, kterýžto je do jisté míry přístupný teoretickému zpracování.

($\Longrightarrow$ dilatace času, frekvenční posun a ohyb paprsků v gravitačním poli)



Princip obecné relativity (Princip obecné kovariance)

- Všechny vztažné soustavy jsou fyzikálně rovnocenné.
- Rovnice vyjadřující fyzikální zákony musí mít ve všech vztažných soustavách stejný tvar (musí mít fyzikální obsah nezávislý na soustavě).



Elegantní již v négligée

Princip obecné relativity (Princip obecné kovariance)

- Všechny vztažné soustavy jsou fyzikálně rovnocenné.
- Rovnice vyjadřující fyzikální zákony musí mít ve všech vztažných soustavách stejný tvar (musí mít fyzikální obsah nezávislý na soustavě).

Princip ekvivalence



Elegantní již v négligée

Princip obecné relativity (Princip obecné kovariance)

- Všechny vztažné soustavy jsou fyzikálně rovnocenné.
- Rovnice vyjadřující fyzikální zákony musí mít ve všech vztažných soustavách stejný tvar (musí mít fyzikální obsah nezávislý na soustavě).

Princip ekvivalence

- V daném $\vec{g}\left(=-\frac{GM}{r^2}\,\vec{r}_0\right)$ padají všechna volná tělesa se stejným $\vec{a}$.
- $m\vec{a}=-\frac{GMm}{r^2}\,\vec{r}_0$



Elegantní již v négligée

Princip obecné relativity (Princip obecné kovariance)

- Všechny vztažné soustavy jsou fyzikálně rovnocenné.
- Rovnice vyjadřující fyzikální zákony musí mít ve všech vztažných soustavách stejný tvar (musí mít fyzikální obsah nezávislý na soustavě).

Princip ekvivalence

- V daném $\vec{g}\left(= -\frac{GM}{r^2}\,\vec{r}_0\right)$ padají všechna volná tělesa se stejným $\vec{a}$.
- $\underbrace{m}_{\text{setrvačná}}\,\vec{a} = -\frac{GM}{r^2}\underbrace{m}_{\text{gravitační}}\,\vec{r}_0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad m_{\text{setrvačná}} = m_{\text{gravitační}}$



Elegantní již v négligée

Princip obecné relativity (Princip obecné kovariance)

- Všechny vztažné soustavy jsou fyzikálně rovnocenné.
- Rovnice vyjadřující fyzikální zákony musí mít ve všech vztažných soustavách stejný tvar (musí mít fyzikální obsah nezávislý na soustavě).

Princip ekvivalence

- V daném $\vec{g}\left(= -\frac{GM}{r^2}\vec{r}_0\right)$ padají všechna volná tělesa se stejným $\vec{a}$.
- $\underbrace{m}_{\text{setrvačná}}\vec{a} = -\frac{GM}{r^2}\underbrace{m}_{\text{gravitační}}\vec{r}_0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad m_{\text{setrvačná}} = m_{\text{gravitační}}$
- Vůči volně padajícím systémům se volná tělesa pohybují bez zrychlení (naopak vůči urychleným systémům se pohybují zrychleně, a to stejně, jako vůči neurychleným v odpovídajícím gravitačním poli).
- Ve volně padajících systémech $\overbrace{\qquad\qquad}^{\text{LOKÁLNĚ}}$ platí speciální teorie relativity. ($\Rightarrow$ LOKÁLNÍ inerciální systémy)

Vnitřní elegance

Ernst Mach: ne $A \longrightarrow B$, ale $\boxed{A \longleftrightarrow B}$



Vnitřní elegance

Ernst Mach: ne $\mathsf{A} \longrightarrow \mathsf{B}$, ale $\boxed{\mathsf{A} \longleftrightarrow \mathsf{B}}$

$\Longrightarrow$ žádné “absolutní” prvky!

(s à priori zadanými vlastnostmi, neprovázané dynamicky s ostatními)

Vnitřní elegance

Ernst Mach: ne $A \longrightarrow B$, ale $\boxed{A \longleftrightarrow B}$

$\Longrightarrow$ žádné “absolutní” prvky!

(s à priori zadanými vlastnostmi, neprovázané dynamicky s ostatními)

- vztažný systém: daný rozložením hmoty; pokud ne, pak všechny rovnocenné
- fyzikální “jeviště” (prostoročas): vzájemně se ovlivňující s hmotou
- vlastnosti těles: ne “vnitřní”, ale ovlivněné interakcí s ostatními tělesy (“Machův princip”)
- parametry teorie: co nejméně volných, neurčených konstant!



Vnitřní elegance

Ernst Mach: ne A $\longrightarrow$ B, ale $\boxed{\text{A} \longleftrightarrow \text{B}}$

$\Longrightarrow$ žádné "absolutní" prvky!

(s à priori zadanými vlastnostmi, neprovázané dynamicky s ostatními)

- vztažný systém: daný rozložením hmoty; pokud ne, pak všechny rovnocenné
- fyzikální "jeviště" (prostoročas): vzájemně se ovlivňující s hmotou
- vlastnosti těles: ne "vnitřní", ale ovlivněné interakcí s ostatními tělesy ("Machův princip")
- parametry teorie: co nejméně volných, neurčených konstant!

obecná relativita:

- vztažný systém: všechny rovnocenné
- prostoročas: vzájemně se ovlivňující s hmotou (ne nutně euklidovský/Minkowského!)
- "Machův princip": spíše ano (kbelík a "dragging" / prázdný prostor)
- neurčené aspekty: c, G, Λ; "dřevěná" strana polních rovnic



Vnější elegance — jazyk geometrie

gravitační interakce je univerzální (Galilei)

$\Longrightarrow$ může být "*geometrizována*" (viz Maxwell!)





K. F. Gauss

N. I. Lobačevskij, B. Riemann

G. Ricci-Curbastro, T. Levi-Cività:

---

tenzorový počet na varietách (obecně zakřivených!) / diferenciální geometrie, konkrétně *teorie pseudo–Riemannových variet*

(Riemann, habilitace 10.6.1854 $\rightarrow$ matematická elegance, nalezená po 60 letech v přírodě. . .)



Vnější elegance — jazyk geometrie

gravitační interakce je univerzální (Galilei)

$\Longrightarrow$ může být "*geometrizována*" (viz Maxwell!)





K. F. Gauss

N. I. Lobačevskij, B. Riemann

G. Ricci-Curbastro, T. Levi-Cività:

---

tenzorový počet na varietách (obecně zakřivených!) / diferenciální geometrie,

konkrétně *teorie pseudo–Riemannových variet*

(Riemann, habilitace 10.6.1854 $\rightarrow$ matematická elegance, nalezená po 60 letech v přírodě. . .)

- metrický tenzor a interval ("vzdálenost"): $\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu$
- afinní konexe a paralelní přenos: $\frac{\mathrm{d}V^\mu}{\mathrm{d}p} = -\Gamma^\mu{}_{\rho\sigma} V^\rho \frac{\mathrm{d}x^\sigma}{\mathrm{d}p}$
- $\Rightarrow$ pojem "přímky": tzv. geodetika

  $\equiv$ křivka, podél níž se její tečný vektor $\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}p}$ přenáší paralelně

  (t.j. míří "stále ve stejném směru"): $\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}p^2} + \Gamma^\mu{}_{\rho\sigma}\frac{\mathrm{d}x^\rho}{\mathrm{d}p}\frac{\mathrm{d}x^\sigma}{\mathrm{d}p} = 0$

  $+$ další vlastnosti přímky (rovnoměrný přímočarý pohyb; extremála)



… a jak to psal Einstein:



(1)

Zur allgemeinen Relativitätstheorie. A. Einstein.

§1. Allgemeines.

Die ~~mächtigste Impulse~~ theoretischen Bestrebungen der letzten Jahre auf dem Gebiet der allgemeinen Relativitätstheorie ent~~springen~~ sprechen zwei verschiedenen ~~Quellen~~ Gedanken. Erstens war man bestrebt, das Gravitationsfeld und das elektromagnetische Feld ~~unter einen einzigen~~ als Wesenseinheit zu begreifen, zweitens ergab die ~~Spalt~~ Loslösung des Begriffes des affinen Zusammenhanges von dem ursprünglich rein metrischen Fundament der Riemann'schen Geometrie neue Möglichkeiten bezw. Beschränkungen für die Auswahl der die Naturgesetze ausdrückenden Gleichungen.

Die Basis der Riemann'schen Geometrie ist die ~~Fundamental~~ metrische Invariante

$$ds^2 = g_{\mu\nu}\, dx_\mu\, dx_\nu, \quad \dots (1)$$

~~welche~~ aus welcher alle anderen Begriffe der Theorie abgeleitet werden. Von diesen abgeleiteten Begriffen interessiert uns hier in erster Linie der ~~jenige~~ den affinen Zusammenhang bestimmende Begriff der Parallelverschiebung von Vektoren gemäss der Formel

$$\delta A^\mu = -\Gamma^\mu_{\alpha\beta} A^\alpha dx_\beta, \quad \dots (2)$$

wobei gemäss der Riemann'schen Geometrie die $\Gamma^\mu_{\alpha\beta}$ gegeben sind durch

$$\Gamma^\mu_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma}\left(\frac{\partial g_{\sigma\alpha}}{\partial x_\beta} + \frac{\partial g_{\sigma\beta}}{\partial x_\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x_\sigma}\right). \dots (3)$$

Die Grössen $\Gamma^\mu_{\alpha\beta}$ scheinen zuerst von Christoffel eingeführt zu sein. Ihre geometrische Deutung als Koeffizienten des Gesetzes der Parallelverschiebung rührt aber erst von Levi-Civita und Weyl her. Die fundamentale Bedeutung der Γ liegt vor allem darin, dass sie allein den Riemann'schen Krümmungstensor $R^i_{k,lm}$ bestimmen sowie dessen für die Theorie des Gravitationsfeldes wichtige Verjüngung R_{kl}.

Die Abhängigkeit (3) des Gesetzes (2) der Parallel-verschiebung von der Fundamental-Invariante (1) kommt in der Riemann'schen Geometrie sowie in der allgemeinen Relativitätstheorie in ihrer ursprünglichen Form (abgesehen von der selbständig postulierten Symmetrie-Bedingung $\Gamma^\mu_{\alpha\beta} = \Gamma^\mu_{\beta\alpha}$) dadurch zustande, dass von dem Parallel-Verschiebungs-Gesetz gefordert wird, dass der Betrag $g_{\mu\nu}A^\mu A^\nu$ eines kontravarianten Vektors sich bei ~~seiner~~ Verschiebung gemäss (2) sich nicht ändere. Dies kommt analytisch

A. Einstein Archive 2-092



(3)

§2. Die bisherige Ausgestaltung der Theorie.

Der ~~ursprüngliche~~ Sinn der in Gleichung (1) eingeführten Feldvariabeln $g_{\mu\nu}$ ist der, dass sie die (mit Masstäben und Uhren ~~messbare~~ kontrollierbare) Metrik des Raumes bestimmen. Sie bestimmen aber zweitens auch das Gravitationsfeld. Die zu (1) gehörigen Extremalkurven (geodätische Linien)

$$\frac{d^2x^\nu}{ds^2} + \Gamma^\nu_{\alpha\beta}\frac{dx^\alpha}{ds}\frac{dx^\beta}{ds} = 0, \quad \dots (2)$$

in welchen die $\Gamma^\nu_{\alpha\beta}$ in bekannter Weise sich durch die $g_{\mu\nu}$ und ihren ersten Differentialquotienten (in letzteren linear) ausdrücken, sollen nämlich die Bewegungsgleichungen des ungeladenen Massenpunktes darstellen. Die Grössen Γ sind also als Feldstärken des Gravitationsfeldes aufzufassen, und die $g_{\mu\nu}$ ~~bestimmen~~ beschreiben auch das Gravitationsfeld.

Es entsteht zunächst das Problem, das Gesetz des reinen Gravitationsfeldes zu finden, ~~Als solches wird man das einfachste kovariante Gesetz für die $g_{\mu\nu}$~~ Man wird zu vermuten haben, dass dies Gesetz durch ein einfaches kovariantes Gleichungssystem geliefert wird, welches sich für die $g_{\mu\nu}$ aufstellen lässt, derart, dass in dies Gleichungssystem nur die $g_{\mu\nu}$ und ~~deren~~ Differentialquotienten dieser Grössen nach den Koordinaten eingehen. Dies Gesetz ist bestimmt durch die Forderung, dass es keine höheren als die zweiten Ableitungen der $g_{\mu\nu}$, diese aber linear enthalten soll. Man erhält so die Gleichungen

$$R_{ik} = 0, \quad \dots (3)$$

deren linke Seiten durch einmalige Verjüngung des Riemann-Tensors

$$R^\alpha{}_{i,k\beta}$$

nach den Indices α und β entstehen.

Besonders interessant ist, dass die Gleichungen (2) und (3) nicht voneinander unabhängige Prämissen der Theorie darstellen, indem das Bewegungsgesetz (2) durch die Feldgleichungen (3) bestimmt wird. Die Ableitung ist aber noch nicht mit der wünschbaren Schärfe und Sauberkeit gegeben worden.

A. Einstein Archive 2-111

Hlavní idea a předpověď: prostoročas je zakřivený



Hlavní idea a předpověď: prostoročas je zakřivený

- PROČ? Protože v něm je hmota (která má nějakou energii).



Hlavní idea a předpověď: prostoročas je zakřivený

- PROČ? Protože v něm je hmota (která má nějakou energii).
- JAK? Podle Einsteinových rovnic

(*Kepler : "Kde je hmota, tam je i geometrie."*)

$$\boxed{R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}}$$



Hlavní idea a předpověď: prostoročas je zakřivený

- PROČ? Protože v něm je hmota (která má nějakou energii).
- JAK? Podle Einsteinových rovnic

$(Kepler: \text{“}Kde\ je\ hmota,\ tam\ je\ i\ geometrie.\text{”})$

$$\boxed{R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}}$$

pěkně hustý

“mramorově krásná” strana

strana “dosud škaredá, ze dřeva vystavěná”

$R^{\mu}{}_{\nu\kappa\lambda} \equiv \Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda,\kappa} - \Gamma^{\mu}{}_{\nu\kappa,\lambda} + \Gamma^{\mu}{}_{\iota\kappa}\Gamma^{\iota}{}_{\lambda\nu} - \Gamma^{\mu}{}_{\iota\lambda}\Gamma^{\iota}{}_{\kappa\nu}$ .... Riemannův tenzor

$R_{\nu\lambda} \equiv R^{\sigma}{}_{\nu\sigma\lambda}$ .... Ricciho tenzor

$R \equiv R^{\sigma}{}_{\sigma}$ .... skalární křivost



Hlavní idea a předpověď: prostoročas je zakřivený

- PROČ? Protože v něm je hmota (která má nějakou energii).
- JAK? Podle Einsteinových rovnic

$(Kepler: \text{“}Kde\ je\ hmota,\ tam\ je\ i\ geometrie.\text{”})$

$$\boxed{R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}}$$

pěkně hustý

“mramorově krásná” strana

strana “dosud škaredá, ze dřeva vystavěná”

$R^{\mu}{}_{\nu\kappa\lambda} \equiv \Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda,\kappa} - \Gamma^{\mu}{}_{\nu\kappa,\lambda} + \Gamma^{\mu}{}_{\iota\kappa}\Gamma^{\iota}{}_{\lambda\nu} - \Gamma^{\mu}{}_{\iota\lambda}\Gamma^{\iota}{}_{\kappa\nu}$ . . . . Riemannův tenzor

$R_{\nu\lambda} \equiv R^{\sigma}{}_{\nu\sigma\lambda}$ . . . . Ricciho tenzor

$R \equiv R^{\sigma}{}_{\sigma}$ . . . . skalární křivost

- JAK SE TO POZNÁ? Neplatí poučky Eukleidovy geometrie:
součet úhlů v trojúhelníku, plocha sféry (obvod kružnice), “přímky”, . . .



Hlavní idea a předpověď: prostoročas je zakřivený

- PROČ? Protože v něm je hmota (která má nějakou energii).
- JAK? Podle Einsteinových rovnic

$(Kepler: \text{“}Kde\ je\ hmota,\ tam\ je\ i\ geometrie.\text{”})$

$$\boxed{R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}}$$

pěkně hustý

“mramorově krásná” strana — strana “dosud škaredá, ze dřeva vystavěná”

$R^{\mu}{}_{\nu\kappa\lambda} \equiv \Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda,\kappa} - \Gamma^{\mu}{}_{\nu\kappa,\lambda} + \Gamma^{\mu}{}_{\iota\kappa}\Gamma^{\iota}{}_{\lambda\nu} - \Gamma^{\mu}{}_{\iota\lambda}\Gamma^{\iota}{}_{\kappa\nu}$ .... Riemannův tenzor

$R_{\nu\lambda} \equiv R^{\sigma}{}_{\nu\sigma\lambda}$ .... Ricciho tenzor

$R \equiv R^{\sigma}{}_{\sigma}$ .... skalární křivost

- JAK MOC KOLEM ZEMĚ? Moc ne:

$$\text{křivost na povrchu} \sim \left| \frac{\mathrm{d}^2\Phi_Z}{\mathrm{d}r^2} \right|_{r=R_Z} = \frac{GM_Z}{c^2 R_Z^3}$$

$$\text{odpovídající poloměr křivosti} = \frac{1}{\sqrt{\text{křivost}}} \sim \frac{R_Z}{\sqrt{|\Phi_Z|}} \sim 10^8\,\text{km}$$



Hlavní idea a předpověď: prostoročas je zakřivený

- PROČ? Protože v něm je hmota (která má nějakou energii).
- JAK? Podle Einsteinových rovnic

$(Kepler: \text{“}Kde\ je\ hmota,\ tam\ je\ i\ geometrie.\text{”})$

$$\boxed{R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}}$$

pěkně hustý

“mramorově krásná” strana — strana “dosud škaredá, ze dřeva vystavěná”

$R^{\mu}{}_{\nu\kappa\lambda} \equiv \Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda,\kappa} - \Gamma^{\mu}{}_{\nu\kappa,\lambda} + \Gamma^{\mu}{}_{\iota\kappa}\Gamma^{\iota}{}_{\lambda\nu} - \Gamma^{\mu}{}_{\iota\lambda}\Gamma^{\iota}{}_{\kappa\nu}$ .... Riemannův tenzor

$R_{\nu\lambda} \equiv R^{\sigma}{}_{\nu\sigma\lambda}$ .... Ricciho tenzor

$R \equiv R^{\sigma}{}_{\sigma}$ .... skalární křivost

- KDE VÍC? V okolí velmi kompaktních objektů (bílí trpaslíci, neutronové hvězdy, černé díry).

Např. těsně u černé díry: $\text{poloměr křivosti} \sim r_g \equiv \frac{2GM}{c^2}$.

$\Longrightarrow$ KDE NUTNO POUŽÍVAT OBECNOU RELATIVITU



Křivost je hrubá neřest!

- mnoho hmoty v malém objemu → geometrie kolem VELMI odlišná od Eukleidovy



Křivost je hrubá neřest!

- mnoho hmoty v malém objemu

geometrie kolem VELMI odlišná od Eukleidovy

extrémní případ:

(K. Schwarzschild 1915; 60's)



Křivost je hrubá neřest!

- mnoho hmoty v malém objemu

geometrie kolem VELMI odlišná od Eukleidovy

extrémní případ:

(K. Schwarzschild 1915; 60’s)

pěkně hustý



Křivost je hrubá neřest!

- mnoho hmoty v malém objemu

geometrie kolem VELMI odlišná od Eukleidovy

extrémní případ:

(K. Schwarzschild 1915; 60’s)

ČERNÁ DÍRA

pěkně hustý

- i když je geometrie v každém místě jen NEPATRNĚ odlišná od Eukleidovy, GLOBÁLNÍ vlastnosti prostoročasu mohou být ZNAČNĚ odlišné

$\longrightarrow$ KOSMOLOGIE: VESMÍR JE DYNAMICKÝ (A. Friedmann 1922; E. P. Hubble)



Křivost je hrubá neřest!

- mnoho hmoty v malém objemu → geometrie kolem VELMI odlišná od Eukleidovy

  extrémní případ: ČERNÁ DÍRA ← pěkně hustý

  (K. Schwarzschild 1915; 60's)

- i když je geometrie v každém místě jen NEPATRNĚ odlišná od Eukleidovy, GLOBÁLNÍ vlastnosti prostoročasu mohou být ZNAČNĚ odlišné

  ⟶ KOSMOLOGIE: VESMÍR JE DYNAMICKÝ (A. Friedmann 1922; E. P. Hubble)

- geometrií prostoročasu se mohou šířit rozruchy přenášející energii

  ⟶ GRAVITAČNÍ VLNY (Einstein 1915; PSR 1913+16)



Křivost je hrubá nerest!

- mnoho hmoty v malém objemu ⟶ geometrie kolem VELMI odlišná od Eukleidovy

  extrémní případ:
  (K. Schwarzschild 1915: 60's)

  ČERNÁ DÍRA

  pěkně hustý



- i když je geometrie v každém místě jen NEPATRNĚ odlišná od Eukleidovy, GLOBÁLNÍ vlastnosti prostoročasu mohou být ZNAČNĚ odlišné

  ⟶ KOSMOLOGIE: VESMÍR JE DYNAMICKÝ (A. Friedmann 1922; E. P. Hubble)

- geometrií prostoročasu se mohou šířit rozruchy přenášející energii

  ⟶ GRAVITAČNÍ VLNY (Einstein 1918; PSR 1913+16)

s obecnou relativitou je vesmír záživnější



“Vycházel jsem ze skeptického Machova empirismu,





“Vycházel jsem ze skeptického Machova empirismu,

. . . ale problém gravitace ze mne udělal věřícího racionalistu, který hledá jediný spolehlivý zdroj pravdy v matematické jednoduchosti.”





Černé díry



Černé díry



16. Hence, according to article 10, if the ſemi-diameter of a ſphære of the ſame denſity with the ſun were to exceed that of the ſun in the proportion of 500 to 1, a body falling from an infinite height towards it, would have acquired at its ſurface a greater velocity than that of light, and conſequently, ſuppoſing light to be attracted by the ſame force in proportion to its vis inertiæ, with other bodies, all light emitted from ſuch a body would be made to return towards it, by its own proper gravity.

- J. Michell, 1784:



Černé díry

- J. Michell, 1784:

16. Hence, according to article 10, if the ſemi-diameter of a ſphære of the ſame denſity with the ſun were to exceed that of the ſun in the proportion of 500 to 1, a body falling from an infinite height towards it, would have acquired at its ſurface a greater velocity than that of light, and conſequently, ſuppoſing light to be attracted by the ſame force in proportion to its vis inertiæ, with other bodies, all light emitted from ſuch a body would be made to return towards it, by its own proper gravity.

- K. Schwarzschild, prosinec 1915:

$$\mathrm{d}s^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 \mathrm{d}t^2 + \frac{\mathrm{d}r^2}{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} + r^2 \left(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta \, \mathrm{d}\phi^2\right)$$



Černé díry



16. Hence, according to article 10, if the ſemi-diameter of a ſphære of the ſame denſity with the ſun were to exceed that of the ſun in the proportion of 500 to 1, a body falling from an infinite height towards it, would have acquired at its ſurface a greater velocity than that of light, and conſequently, ſuppoſing light to be attracted by the ſame force in proportion to its vis inertiæ, with other bodies, all light emitted from ſuch a body would be made to return towards it, by its own proper gravity.

- J. Michell, 1784:
- K. Schwarzschild, prosinec 1915:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 \mathrm{d}t^2 + \frac{\mathrm{d}r^2}{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} + r^2 \left(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta \, \mathrm{d}\phi^2\right)$$

- Chandrasekhar, Landau, Oppenheimer, Volkoff, Snyder – 30. léta: dostatečně nahuštěná hmota opravdu gravitačně zkolabuje



Černé díry

> 16. Hence, according to article 10, if the ſemi-diameter of a ſphære of the ſame denſity with the ſun were to exceed that of the ſun in the proportion of 500 to 1, a body falling from an infinite height towards it, would have acquired at its ſurface a greater velocity than that of light, and conſequently, ſuppoſing light to be attracted by the ſame force in proportion to its vis inertiæ, with other bodies, all light emitted from ſuch a body would be made to return towards it, by its own proper gravity.

- J. Michell, 1784:
- K. Schwarzschild, prosinec 1915:

$$\mathrm{d}s^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 \mathrm{d}t^2 + \frac{\mathrm{d}r^2}{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} + r^2 \left(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta \, \mathrm{d}\phi^2\right)$$

- Chandrasekhar, Landau, Oppenheimer, Volkoff, Snyder – 30. léta: dostatečně nahuštěná hmota opravdu gravitačně zkolabuje
- Kde může k dostatečnému nahuštění dojít?
  – jádra dost hmotných hvězd poté, co v nich skončí TN reakce
  – jádra galaxií
  – snad i centra kulových hvězdokup



Černé díry

- J. Michell, 1784:

16. Hence, according to article 10, if the ſemi-diameter of a ſphære of the ſame denſity with the ſun were to exceed that of the ſun in the proportion of 500 to 1, a body falling from an infinite height towards it, would have acquired at its ſurface a greater velocity than that of light, and conſequently, ſuppoſing light to be attracted by the ſame force in proportion to its vis inertiæ, with other bodies, all light emitted from ſuch a body would be made to return towards it, by its own proper gravity.

- K. Schwarzschild, prosinec 1915:

$$\mathrm{d}s^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 \mathrm{d}t^2 + \frac{\mathrm{d}r^2}{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} + r^2 \left(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta \, \mathrm{d}\phi^2\right)$$

- Chandrasekhar, Landau, Oppenheimer, Volkoff, Snyder – 30. léta: dostatečně nahuštěná hmota opravdu gravitačně zkolabuje
- Kde může k dostatečnému nahuštění dojít?
  – jádra dost hmotných hvězd poté, co v nich skončí TN reakce
  – jádra galaxií
  – snad i centra kulových hvězdokup
- Co na to pozorování? Dlouho nic. . .
  (Eddington: “Hvězdám by se mělo zakázat dělat takové hlouposti!”)
  až 60. léta: 1962 X-zdroje, 1963 kvasary, 1967 pulsary!



Černé díry

- Observační argumenty:

  velká svítivost z malého objemu ($\Leftarrow$ z rychlé proměnnosti)
  tvrdé (rentgenové) záření ($\Rightarrow$ mimořádná teplota)
  velká (– přitom neviditelná –) M v malém V ($\Leftarrow$ z oběžné rychlosti)
  "širší" rozdělení oběžných rychlostí
  spektrální čáry rozšířené daleko do červena a "rohaté" ($^{56}_{26}$Fe: Kα)
  rychlé kvazi-periodické oscilace (rotace kolem kompaktního zdroje?)
  akreční disky "dominované advekcí" (č.díry $\times$ n.hvězdy)



Černé díry

- Observační argumenty:

  velká svítivost z malého objemu ($\Leftarrow$ z rychlé proměnnosti)
  tvrdé (rentgenové) záření ($\Rightarrow$ mimořádná teplota)
  velká (– přitom neviditelná –) M v malém V ($\Leftarrow$ z oběžné rychlosti)
  "širší" rozdělení oběžných rychlostí
  spektrální čáry rozšířené daleko do červena a "rohaté" ($^{56}_{26}$Fe: Kα)
  rychlé kvazi-periodické oscilace (rotace kolem kompaktního zdroje?)
  akreční disky "dominované advekcí" (č.díry $\times$ n.hvězdy)

- Dnešní kandidáti:

  jádro Galaxie
  jádra ostatních galaxií
  (speciálně aktivních galaxií: velká svítivost, rychlá proměnnost, "jety")
  těsné rentgenové dvojhvězdy
  možná i některé kulové hvězdokupy



Vsuvka — zdroje tvrdého záření v astrofyzice

- anihilace (elektron-pozitron)
  $\rightarrow$ 511keV (γ-obor)
  nutný velmi energetický proces, aby e-p pár vůbec vznikl
- interakce částic se zářením (“comptonizace”)
- synchrotronové záření (rychlé nabité částice v magnetickém poli)
- látka o velmi vysoké teplotě (více než $\sim 10^6$ K)
- rozpad radioaktivních jader

Černé díry v aktivních galaktických jádrech









Galaxy M87
4000 light years
2000 light years
VLA
Radio
0.1 light years
HST • WFPC2
Visible
VLBA
Radio
NASA, NRAO and J. Biretta (STScI) • STScI-PRC99-43




CHANDRA X-RAY
DSS OPTICAL
NRAO RADIO CONTINUUM
NRAO RADIO (21-CM)





Černé díry v aktivních galaktických jádrech

$^{56}_{26}$Fe čáry Kα v rentgenovém spektru (6.4 keV)



NGC-3516



MCG-6-30-15

Černé díry hvězdné velikosti — rentgenové dvojhvězdy a μ kvasary




To Earth



NON-SPINNING BLACK HOLE
X-RAY FLUX
1.2
1.1
1
2
4
6
8
10
ENERGY (keV)
SPINNING BLACK HOLE
X-RAY FLUX
1.2
1.1
1
2
4
6
8
10
ENERGY (keV)



Černé díry hvězdné velikosti — rentgenové dvojhvězdy a μ kvasary

Crab-nebula pulsar



Vela pulsar



Černé díry v "normálních" jádrech galaxií









Černé díry v “normálních” jádrech galaxií







Chandra ultra deep field (23 dní, 3/5 úplňku)







Combined 2MASS–MSX View of the Galactic Center



Černá díra v centru naší galaxie — Sag A*



rádiová struktura většího okolí jádra



Černá díra v centru naší galaxie — Sag A^*



60 světelných let v X-záření (Chandra)

Černá díra v centru naší galaxie — Sag A*



10 světelných let v X-záření (Chandra)



Černá díra v centru naší galaxie — Sag A*



2 světelné roky v infračerveném záření (ESO)

Černá díra v centru naší galaxie — Sag A*




hvězdy (S*) v okruhu 1 světelného měsíce



Černá díra v centru naší galaxie — Sag A*



záblesk 20 minut



511keV! (Integral)

Kosmologie — WMAP



Kosmologie — WMAP





Kosmologie — WMAP





Kosmologie — WMAP



23-33-41-61-94 GHz

Kosmologie — WMAP





Kosmologie — WMAP

Vesmír po WMAPu:

- je mu 13.7 miliardy let ($\pm 1\%$)
- první hvězdy se zažehly 200 miliónů let po BB
- reliktní záření vzniklo 379 tisíc let po BB
- obsah vesmíru: 4% atomů, 23% temné hmoty, 73% temné energie
- $H_0 = 71 \mathrm{km/s/Mpc}$ ($\pm 5\%$)
- inflace asi proběhla
- vesmír je asi otevřený, ale záleží na povaze temné energie



Gravitační vlny — konečně na obzoru?





Gravitační vlny — konečně na obzoru?

Binární systém PSR 1913+16 vyzařuje gravitační vlny



T ~ 8 hod
a ~ 10^6 km



obě neutronové hvězdy se po spirále přibližují při každém oběhu o 3 mm , neboť gravitační vlny odnášejí energii

pozorovaní zcela souhlasí
s předpovědí obecné teorie relativity

Gravitační vlny — konečně na obzoru?



Přístroje — černé díry

Hubble space telescope

Přístroje — černé díry

Chandra

Přístroje — černé díry



XMM-Newton

Přístroje — černé díry



Integral



Letecký den kolem IMBHs v NGC-4485 a 4490

Přístroje — kosmologie



WMAP v bodě L2



Přístroje — gravitační vlny





Přístroje — gravitační vlny

LIGO (Hanford & Livingstone)





Přístroje — gravitační vlny



Přístroje — gravitační vlny

Přístroje — gravitační vlny



LISA

Přístroje — gravitační vlny



Experiment Gravity Probe B

Experiment Gravity Probe B







Experiment Gravity Probe B





Experiment do kapsy

GPS

Einstein



Einstein

Einstein



Einstein









DEAR MR. EINSTEIN
I AM A LITTLE GIRL OF SIX.
I SAW YOUR PICTURE IN THE PAPER.
I THINK YOU OUGHT TO HAVE YOUR HAIRCUT, SO YOU CAN LOOK BETTER.
CORDIALLY YOURS,
ANN G. KOCIN.

Letter from Ann G. Kocin, 1951



NGC-4261 čistě z lásky

Happy Valentine's Day to the one I love.



"Gravity cannot be held responsible for people falling in love."